

●ベイト型殺虫剤

殺虫剤

ネキリエースK

(イソキサチオン粒剤)

有効成分：イソキサチオン…0.5%

農林水産省登録第 20860 号
 性状：赤紫色粒状 粒径 3mm
 粒長 2mm～10mm
 毒性：普通物*
 有効年限：5 年
 包装：2kg×8
 *は毒劇物に該当しないものを指している通称

■■■ 特長 ■■■

- ばらまくだけのかたん処理！
- ベイト（毒餌）型の殺虫剤で、優れた誘因効果により虫を引きつけます。

■■■ 適用病害虫名と使用方法 ■■■

平成 22 年 11 月現在の登録内容

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イソキサチオンを含む農薬の総使用回数	
はくさい	コオロギ類	3kg /10a	は種時又は定植時～生育初期 但し、収穫 14 日前まで	1 回	土壌表面 株元処理	1 回	
キャベツ だいこん はつかだいこん	ネキリムシ類		は種時又は定植時				
ブロッコリー			定植時～生育初期 但し、収穫 14 日前まで	4 回以内		4 回以内	
レタス			は種時又は定植時～生育初期 但し、収穫 21 日前まで	2 回以内		2 回以内	
非結球レタス			は種時又は定植時				
なばな			発芽期まで	1 回		1 回	
だいず			は種時～ 本葉 2 葉期	2 回以内		2 回以内	2 回以内
えだまめ			収穫 21 日前まで				5 回以内 (粉剤及び粉粒剤のは種時の処理は合計 1 回以内、粉剤及び粉粒剤の定植時は合計 1 回以内、粉剤の土壌表面散布は 1 回以内、粒剤の土壌表面株元処理は 2 回以内)
いちご			ハスモンヨトウ	収穫前日まで		1 回	1 回

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イソキサチオンを含む農薬の総使用回数	
葉ごぼう	ネキリムシ類	3kg /10a	は種時～ 子葉展開期	2回以内	土壌表面 株元処理	2回以内	
ごぼう さといも			収穫14日前まで	4回以内		4回以内	
かぶ			収穫30日前まで	2回以内		土壌表面 株元処理	2回以内
ねぎ							4回以内 (は種時は1回以内、 植付時は1回以内、 植付後は2回以内)
にんじん							4回以内
えごま (種子)			定植時	1回		株元処理	1回
たばこ			植付時		2回以内		

■ 効果・薬害等の注意 ■

- 被害の発生をみたら作物の根際にそのまま散布する。
- つまみ菜・間引き菜には使用しない。

■ 安全使用上の注意 ■

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。
- 誤食などのないよう注意。
- 眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意する。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 散布時は、農薬用マスクなどを着用する。作業後はうがいをする。

治療法…硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤が有効であると報告されている。

魚毒性等…河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。散布器具・容器の洗浄水は河川等に流さない。また空袋などは水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

保管…密封し、直射日光をさけ、食品と区別して冷蔵・乾燥した所。

- 食べられません。
- 有効年月内に使用する。
- 体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取扱い及び作業をしない。