

●スズメノカタビラ・メヒシバ防除に卓効をしめします。

ワサレス 顆粒水和剤 DF

(ナプロパミド水和剤)

有効成分：ナプロパミド…48.0% 銹物質微粉等…52.0%

除草剤

農林水産省登録第 20083 号
性状：淡褐色水和性細粒
毒性：普通物*
有効年限：3 年
容量：1kg×10
*は毒劇物に該当しないものを指している通称

■ 特長 ■

●優れた除草効果

一年生イネ科雑草（スズメノカタビラ、メヒシバ等）に高い防除効果を発揮します。

●環境・芝に安心

日本芝（コウライシバ、ノシバ）に高い安全性が確認されています。芝地では土壤中の動きが少なく、地下水、河川水に流れ出る危険が少なく環境に対して安全です。

■ 適用雑草と使用方法 ■

平成 21 年 5 月現在の登録内容

作物名	適用雑草名	使用時期	10 アール当たり使用量		本剤及びナプロパミドを含む農薬の総使用回数	使用方法
			薬量	希釈水量		
日本芝	一年生イネ科雑草	雑草発生前(芝生育期)	400～600g	200～300ℓ	3 回以内	全面土壌散布

■ 効果・薬害等の注意 ■

- 使用後の散布器具は十分水洗いする。
- 肥料や他の農薬との混用は避ける。
- 散布器具、容器の洗浄水及び使用残りの薬液は河川等に流さず、空袋等は環境に影響を与えないよう、安全に処理する。
- 公園等で使用する場合、特に以下のことに注意する。
 - 激しい降雨の予想される場合は使用をさける。
 - 散布薬液の飛散、あるいは本剤の流出によって有用植物に薬害が生じることのないよう十分に注意して散布する。
 - 水源池等に本剤が飛散・流入しないよう十分に注意する。
 - 散布薬液の飛散によって自動車やカラートタンの塗装等へ影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意する。
 - 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管する。

- 使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 残効性があるので、後作物栽培までの期間が短い場合には後作物に影響を及ぼすおそれがあるので注意する。特にいね科作物、うり科作物、ほうれんそう、さといも、にんじん等を後作に作る事はさける。
- 食べられません。
- 有効年月内に使用する。
- 体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取り扱い及び作業をしない。

■■■ 安全使用上の注意 ■■■

- 眼に入らないように注意。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける（刺激性）。使用後は洗眼する。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係ない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。

魚毒性…水産動物に影響を及ぼすが、通常の使用方法では問題ない。

保管…密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した所。