

●アオムシ防除に

殺虫剤

ポロンク 粉剤DL

(エトフェンプロックス・DEP 粉剤)

有効成分：エトフェンプロックス…0.3%

DEP (PRTR 法第 1 種-225 号) …4.0%

農林水産省登録第 18070 号
性状：類白色粉末
毒性：普通物*
有効年限：4 年
包装：1kg×20、3kg×8
*は毒劇物に該当しないものを指している通称

特長

- エトフェンプロックスと DEP の混合剤で、キャベツ・だいこん・はくさいのアオムシ防除に効果を発揮します。
- きゅうりのワタアブラムシ・みかんのカメムシ類防除にも使えます。
- 希釈のいらぬ粉剤タイプの散布剤です。1kg と 3kg の包装があり、小規模栽培でも活用しやすいのもポイントです。

適用病害虫名と使用方法

平成 22 年 1 月現在の登録内容

| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数 | DEP を含む農薬の総使用回数 |
|------|---------|---------|------------|---------|------|-----------------------|-----------------|
| キャベツ | アオムシ | 4kg/10a | 収穫 7 日前まで | 3 回以内 | 散布 | 3 回以内 | 6 回以内 |
| だいこん | | | 収穫 21 日前まで | | | | |
| はくさい | | | 収穫 7 日前まで | | | | |
| きゅうり | ワタアブラムシ | 収穫前日まで | | | | | |
| みかん | カメムシ類 | 6kg/10a | 収穫 30 日前まで | | | | |

効果・薬害等の注意

- DCPA 剤との同時施用及び 10 日以内の近接散布は、薬害を生ずるおそれがあるのでさける。
- 蚕に対して長時間毒性があるので、近くに桑園がある場合には絶対に桑葉にかからないようにする。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意する。
 - ①ミツバチの巣箱及びその周辺に飛散する恐れがある場合には使用しない。
 - ②養蜂が行われている地区や受粉等を目的としてミツバチを放飼している地区で使用する場合は、関係機関（都道府県の畜産部局や病害虫防除所等）への連絡を徹底し、ミツバチの危害防止に努める。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに

初めて使用する場合には病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

■■■ 安全使用上の注意 ■■■

- 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。
- 作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- かぶれやすい体質の人は取り扱いに十分注意する。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 本剤は水産動物に影響を及ぼすので養殖池等周辺での使用はさける。

解毒剤…DEP の解毒剤としては硫酸アトロピン製剤及び PAM 製剤が有効であると報告されている。

保 管…直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。

- 食べられません。
- 有効年月内に使用する。
- 体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取扱い及び作業をしない。